

1.11. Цирроз печени

Цирроз печени – исход хронического процесса в печени, при котором отмечается гибель и узловая пролиферация паренхимы, а также реактивное разрастание соединительной ткани, в результате чего происходит дезорганизация дольково-сосудистой архитектоники печени с появлением признаков портальной гипертензии, печеночно-клеточных и мезенхимально-воспалительных нарушений.

МКБ-10

K74 Фиброз и цирроз печени

Классификация цирроза печени

1. По морфологическому признаку:

А. Макронодулярный (крупноузловой, постнекротический)

Б. Микронодулярный (портальный, септальный)

Г. Смешанный

Д. Билиарный

2. По этиологическому признаку:

1) инфекционный

2) обменный

3) вследствие обструкции желчных путей

4) застойный как следствие сердечно-сосудистой патологии

5) алкогольный

6) иммунопатологический (аутоиммунный)

7) индийский детский цирроз

8) идиопатический, неклассифицированный (лекарственный – метотрексат и др., квашиокок; язвенный колит и др.)

3. По клинико-функциональному признаку:

Стадия: начальная, сформированная, дистрофическая.

Фаза: неактивная, активная.

Течение: прогрессирующее, стабильное, регрессирующее.

Нарушение функции печени: отсутствует, легкое, тяжелое.

Портальная гипертензия: отсутствует, умеренная, выраженная.

Гиперспленизм: есть, нет.

Пример формулировки диагноза:

Цирроз печени иммунопатологический, макронодулярный, стадия начальная, активная фаза, прогрессирующее течение, без нарушения функции печени.