

1.5. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся пищеводными и внепищеводными клиническими проявлениями и разнообразными морфологическими изменениями слизистой оболочки пищевода вследствие ретроградного заброса в него желудочного или желудочно-кишечного содержимого.

МКБ-10

K21.0 Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом

K21.9 Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита

Классификация ГЭРБ (Приворотский В.Ф., Луппова Н.Е., 2006)

| Степень выраженности гастроэзофагеального рефлюкса | Степень выраженности ГЭР (Rg-исследование) | Степень выраженности и клинических симптомов | Внепищеводные симптомы ГЭРБ | Осложнения ГЭРБ | Инфицирование Нр |
|---|--|--|--|--|--------------------|
| Без эзофагита С эзофагитом (I-IV степени) и степенью нарушения моторики в зоне пищеводножелудочного перехода А, В, С | ГЭР (I-IV степени) | Лёгкая Средней степени Тяжёлая | Бронхолёгочные Кардиальные Оториноларингологические Стоматологические | Пищевод Барретта Стриктура пищевода Анемия постгеморрагическая | Нр(+) Нр(-) |

Пример формулировки диагноза:

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, рефлюкс-эзофагит II степени, среднетяжёлая форма.
Постгеморрагическая анемия.