

2.10. Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз)

Лимфома Ходжкина – это злокачественная опухоль лимфоидной ткани с клональной пролиферацией В-клеток зародышевых центров лимфоузлов. Характерной особенностью лимфомы Ходжкина является локальность процесса на ранних стадиях болезни с постепенным вовлечением в процесс лимфоузлов пограничных областей.

МКБ – 10

C81 Лимфома Ходжкина

Классификация стадий лимфогранулематоза (Энн Арбор (Carbone et al.), 1971)

Стадия	Признаки
I	Поражение лимфатических узлов одной области (I) или поражение одного внелимфатического органа или участка (Ie)
II	Поражение лимфатических узлов двух или нескольких областей по одну сторону диафрагмы (II) либо локализованное поражение внелимфатического органа или участка и лимфатических узлов одной или нескольких областей по одну сторону диафрагмы (IIe)
III	Поражение лимфатических узлов по обе стороны диафрагмы (III), которое может также сопровождаться поражением селезенки (III _s) либо локализованным поражением внелимфатического органа или участка (III _e) или поражение того и другого (III _{se})
IV	Диффузное или диссеминированное поражение одного или нескольких внелимфатических органов или тканей, сопровождающееся или не сопровождающееся поражением лимфатических узлов

A- бессимптомное течение; **B-** лихорадка, проливные поты, потеря массы тела
X – массивное поражение: расширение средостения более чем на треть или размер лимфоузла более 10 см; **E-** вовлечение единичного экстранодулярного участка по протяженности или проксимально к известному нодальному участку; **CS-** клиническая стадия; **PS-** патогистологическая стадия
Локализация поражения в IV стадии обозначается символами: H- печень, M- костный мозг, O – кости, P- плевра, D- кожа, подкожная клетчатка

Пример формулировки диагноза:

Лимфома Ходжкина, IIА стадия, с поражением шейных и надключичных лимфоузлов справа, гистологический вариант – нодулярный склероз.