

2.8. Геморрагический васкулит

Болезнь Шенлейн – Геноха (капилляротоксикоз, «ревматоидная пурпура», геморрагический иммунный тромбоваскулит, аллергическая пурпура) – распространенное системное заболевание с преимущественным поражением мелких сосудов (артериол, капилляров) кожи, суставов, почек, ЖКТ.

МКБ-10

D69.0 Аллергическая пурпура

Классификация геморрагического васкулита (А.С.Калинченко, 1968)

Клинические синдромы	Активность процесса	Вариант течения	Исход заболевания
<ul style="list-style-type: none">● Кожный● Суставной● Абдоминальный● Почечный● Мозговой● Кардиальный	<ul style="list-style-type: none">● I ст.● II ст.● III ст.	<ul style="list-style-type: none">● Острое (до 1,5 мес)● Подострое (>2 мес.)● Хроническое (>1 года)● Рецидивирующее	<ul style="list-style-type: none">● Выздоровление● Переход в хроническую форму● Исход в хронический нефрит

Примеры формулировки диагноза:

Геморрагический васкулит, активность I степени, простая форма (синдром кожный), острое течение.

Геморрагический васкулит, активность II-III степени, смешанная форма (синдромы кожный, суставной, абдоминальный, почечный), подострое течение.