

Задача 3.10.1.

Ребенок 2-х лет находится на лечении в детском лор-отделении по поводу двустороннего гнойного отита. На 6-й день болезни повысилась температура тела до 39,4°C, повторная рвота, расстройство сна, тремор подбородка. При осмотре выявлены резкая ригидность мышц затылка, положительные симптомы Брудзинского верхний, Кернига.

При исследовании ликвора: ликвор мутный, цитоз в 1 мкл – 20000, нейтрофилез – 86%, лимфоциты – 14%, белок – 3,3 г/л, реакция Нонне-Апельта и Панди резко положительная, глюкоза – 1,38 ммоль/л, БК – отрицательный.

При микроскопии осадка ликвора обнаружены грамотрицательные палочки.

При бактериологическом исследовании ликвора и гнойного отделяемого из ушей выделена *H.influenzae*, тип В.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Гемофильная инфекция, вызванная *H.influenzae*, тип В. Двусторонний гнойный отит, осложнение – гнойный менингит.
2. Гемофильная инфекция, тип В, гнойный двусторонний отит, гнойный менингит.
3. Гемофильная инфекция, вызванная *H.influenzae*, тип В; двусторонний гнойный отит; вторичный гнойный менингит, тяжелая форма.