

3.14. Сальмонеллез

Сальмонеллез – инфекционные заболевания, вызываемые бактериями из рода *Salmonella* с фекально-оральным механизмом передачи, протекающие преимущественно по типу гастроэнтероколита, реже с формированием тифоподобных и септических форм. Наиболее часто сальмонеллез у больных вызывается сальмонеллой группы по схеме Кауфмана-Уайта: В (*S. typhimurium*), реже — сальмонеллами групп С (*S. virchow*, *S. infantis*), Е (*S. london*, *S. anatum*), Д (*S. enteritidis*).

МКБ-10

A02.0 Сальмонеллезный энтерит

Клиническая классификация сальмонеллёза

Клинические формы	Тяжесть	Течение
1. Желудочно-кишечная (гастрит, энтерит, энтероколит, колит, гастроэнтероколит)	Легкая	Острое (до 1,5 мес.): с обострением с рецидивами
2. Респираторная (гриппоподобная)	Среднетяжелая	Гладкое
3. Тифоподобная	Тяжелая	Затяжное (до 3 мес.) с клиническими проявлениями:
4. Септическая		непрерывное с рецидивами
5. Бессимптомная (латентная)		латентное (по типу бактериовыделения) Хроническое (свыше 3 мес.) с клиническими проявлениями: непрерывное с рецидивами латентное

Пример формулировки диагноза:

Сальмонеллез, вызванный *S. Derby*, желудочно-кишечная форма, энтероколит, тяжелый, течение острое, осложненное токсикозом с эксикозом II степени.