

Задача 3.15.1.

Мальчик 4 месяцев, находится на искусственном вскармливании. Поступил в стационар на 4-й день болезни в тяжелом состоянии. Заболевание началось с учащения стула до 5 раз в сутки (жидкий, водянистый, желтовато-оранжевого цвета с примесью небольшого количества слизи и зелени), срыгивания, ухудшения аппетита. На 2-й день болезни повысилась температура тела до 37,5°C, была дважды рвота, стул жидкий, непереваренный до 6 раз в сутки. В последующие дни ребенок продолжал лихорадить, рвота и срыгивания (до 3-4 раз в сутки) сохранялись, появились сухость слизистых оболочек, резкое вздутие живота. Стул участился до 15 раз в сутки (жидкий, непереваренный, водянистый, пенистый с небольшим количеством слизи и зелени). Ребенок стал беспокойным, сучил ножками, отказывался от еды, плохо пил воду. Отмечается бледность кожи и "мраморный рисунок", тургор тканей снижен. Дыхание пуэрильное, ЧД - 40 в минуту. Тоны сердца приглушены. Живот резко вздут газами, урчащий во всех отделах. Диурез снижен. Менингеальных симптомов нет.

Анализ кала на кишечную группу: E. Coli O 111.

Копрограмма: консистенция - жидкая, реакция - слабощелочная, мышечные волокна (-), нейтрофильный жир (++) , жирные кислоты (+++), мыла (++) , крахмал (+++), йодофильная флора (+); лейкоциты -1-2 в п/зр.

РНГА: с комплексным шигеллезным Зонне и Флекснера, сальмонеллезным диагностикумами отрицательная.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Эшерихиоз энтеропатогенный, вызванный *E. Coli O 111*, типичная гастроэнтеритическая форма, средней степени тяжести, острое течение, осложненное токсикозом с эксикозом II степени.
2. Эшерихиоз, гастроэнтерит, средней тяжести, острое течение.