

3.21. Ветряная оспа (инфекция Varicella-Zoster - VZV)

Ветряная оспа (опоясывающий лишай) – инфекционные заболевания, вызываемые virus Varicella-Zoster (VZV), характеризующиеся везикулезной сыпью на коже и слизистых оболочках, интоксикацией, и являющиеся потенциально-летальной инфекцией у детей с иммунодефицитными состояниями. Ветряная оспа является проявлением первичной инфекции. При реактивации герпесвирусной инфекции 3 типа заболевание протекает как вторичная (послепервичная) инфекция - герпес зостер инфекция – опоясывающий лишай.

МКБ-10

B01 Ветряная оспа

Клиническая классификация ветряной оспы

Тип	Тяжесть	Течение
I. Типичная	Легкая Среднетяжелая Тяжелая	А) гладкое Б) осложненное: Некрозы кожи и подкожной клетчатки Пиодермии (стрептодермия и др.)
II. Атипичная		Абсцессы Флегмоны Стоматиты Отиты Пневмонии Сепсис Энцефалиты (церебеллит и др.)
1. Рудиментарная		
2. С агравированными симптомами:		
Геморрагическая		
Буллезная		
Пустулезная		
Гангренозная		
Висцеральная		

Пример формулировки диагноза:

Ветряная оспа, типичная форма, средней степени тяжести, осложнившаяся подчелюстным лимфаденитом.