

Задача 3.22.1.

Ребенок 1 год. Заболевание началось остро с повышения температуры до 37,5°C, появился насморк, кашель, слезотечение.

На 3 день вновь отмечалось повышение температуры до 39°C, усилились катаральные явления. На лице, шее появилась пятнисто-папулезная сыпь. Отмечалась светобоязнь. На следующий день температура была субфебрильной (37,2°C), сыпь распространилась на туловище, стала более крупной на лице. Несмотря на то, что самочувствие улучшилось, наличие сыпи заставило мать обратиться на скорую помощь и ребенка госпитализировали в инфекционное отделение.

С 3 месяцев страдает атопическим дерматитом, реакций на пищевые продукты и на медикаменты не было. Получил прививки против ВГВ, БЦЖ, АКДС, полиомиелита.

Данные клинического осмотра. При поступлении состояние ребенка средней степени тяжести, температура 37,8°C. Выражены симптомы интоксикации: ребенок капризничает, вялый, аппетит снижен, мама отмечает беспокойный сон. Выражены катаральные явления: фолликулярный конъюнктивит, серозный ринит, гиперемия и отечность слизистых оболочек ротоглотки, энантемы на дужках, языке. На слизистой щек, видны единичные очажки десквамации эпителия. Миндалины гиперемированы, не увеличены.

На коже лица, щек, шее крупная пятнисто-папулезная сыпь, отдельные элементы сливные. На груди и спине единичные пятнисто-папулезные элементы, значительно мельче, чем на лице. На конечностях сыпи нет. Лимфатические узлы пальпируются по основным группам, множественные, мелкие до 1 см в диаметре.

Во время осмотра у ребенка отмечается сухой надсадный кашель. Над легкими перкуторно определяется легочный звук. Дыхание проводится всюду, хрипы не выслушиваются.

Пульс 120 ударов в минуту, удовлетворительного наполнения и напряжения. Тоны сердца ритмичные, ясные, чистые.

Живот мягкий, безболезненный при глубокой пальпации. Печень и селезенка не увеличены в размерах. Стул оформлен, мочится достаточно.

Менингеальные симптомы отрицательные, изменений со стороны черепно-мозговых нервов нет.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Корь, типичная среднетяжелое течение.
2. Корь, легкая форма.
3. Коревая краснуха, среднетяжелая форма.