

3.26. Эпидемический паротит

Эпидемический паротит (свинка, паротитная инфекция) – острое вирусное заболевание преимущественно слюнных желез, реже других железистых органов (поджелудочная железа, яички, яичники и др.), а также ЦНС (менингит, менингоэнцефалит), сопровождающееся симптомами умеренно выраженной интоксикации. Заболевание наблюдается в виде спорадических вспышек или эпидемических вспышек с контагиозным индексом, превышающим 50,0%. Болеют в основном дети.

МКБ-10

B26 Эпидемический паротит

Классификация эпидемического паротита

Тип	Тяжесть	Показатели тяжести	Течение
1. Типичные: 1) Железистая – изолированное поражение железистых органов (паротит, панкреатит, орхит и др.) 2) Нервная – изолированное поражение ЦНС (серозный менингит, менингоэнцефалит) 3) Комбинированная – поражение ЦНС и железистых органов	а) Легкая б) Среднетяжелая в) Тяжелая	1) Степень поражения желез (одной или нескольких) – припухлость, отечность, болезненность 2) Поражение ЦНС – выраженность менингеальных и менингоэнцефалитических симптомов 3) Степень общей интоксикации: высота и продолжительность температуры, рвота, нарушение общего состояния	Неосложненное Осложненное: стоматит гингивит и др.
2. Атипичные: 1) Стертая 2) Бессимптомная	Незначительная припухлость околоушных или подчелюстных слюнных желез, температура обычно нормальная. Диагноз ставится на основании серологических данных и эпидемиологического анамнеза.		

Пример формулировки диагноза:

Эпидемический паротит (правосторонний субмаксиллит), легкое течение.