

3.28. Цитомегаловирусная инфекция

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) - антропонозная инфекция, вызываемая Cytomegalovirus, передающаяся контактным (преимущественно через слюну, реже с мочой; гемоконтактным – главным образом с компонентами крови - плазма, тромбоцитарная, эритроцитарная масса и др.), воздушно-капельным (чаще в дошкольных образовательных учреждениях), вертикальным (трансплацентарно от матери к ребенку; инфекция входит в группу TORCH). имеющая формы врожденной и приобретенной (протекает как латентная хроническая инфекция; реактивация происходит при развитии ИДС) инфекции.

МКБ-10

B25 Цитомегаловирусная инфекция

Классификация цитомегаловирусной инфекции

Форма	Тяжесть	Течение
Врожденная Приобретенная: <i>локализованная</i> форма с поражением слюнных желез и легочная <i>генерализованная</i> форма - висцеральная (почечная, печеночная, желудочно-кишечная), церебральная Бессимптомные формы	Легкая Среднетяжелая Тяжелая	А) гладкое Б) осложненное: в основном при врожденной форме – микрогирия, гидроцефалия, отставание в физическом и психомоторном развитии, цирроз печени, пороки развития различных органов. При поражении мозга развиваются очаговые некрозы и кальцификаты.

Критерии тяжести: общее состояние больного, выраженность поражения того или иного органа.

Пример формулировки диагноза:

Врожденная цитомегаловирусная инфекция (anti CMV IgM+), среднетяжелая, печеночная форма (гепатит).