

3.3. Аденовирусная инфекция

Аденовирусная инфекция – острая респираторная вирусная инфекция с лихорадкой, умеренной интоксикацией, яркими катаральными явлениями, гиперплазией лимфоидных тканей ротоглотки, слабо выраженной лимфоаденопатией, конъюнктивитом (катаральный, фолликулярный, пленчатый). Чаще вызывается сероварами аденовируса Adv 1, 2, 3, 4, 7, 7a, 14 и 21

МКБ-10

A08.2 Аденовирусная инфекция

Классификация аденовирусной инфекции

Этиология	Основной клинический синдром	Тяжесть	Осложнения
Серовары 1- 50 Чаще вызывается сероварами 1, 2, 3, 4, 7, 7a, 14 и 21	Катар верхних дыхательных путей Фарингоконъюнктивальная лихорадка Кератоконъюнктивит Диарея Тонзиллофарингит Мезентеральный лимфаденит Пневмония Стенозирующий ларинготрахеит I, II, III ст. Сочетанные синдромы и др.	Легкая Среднетяжелая Тяжелая <u>Критерии тяжести:</u> Выраженность симптомов интоксикации, длительность течения болезни, выраженность клинических синдромов болезни, вовлечение новых органов и систем	Обусловлены вторичной бактериальной инфекцией (отит, синусит, пневмония и др.).

Пример формулировки диагноза:

Аденовирусная инфекция (серовар 14), (фарингоконъюнктивальная лихорадка, пленчатый конъюнктивит), средней тяжести, неосложненная.