

3.36. Вирусный гепатит Дельта (HDV–инфекция)

Вирусный гепатит Дельта (ВГД, hepatitis Delta) – острое или хроническое высокоактивное воспалительно-некротическое заболевание печени, вызываемое первично-гепатотропным РНК-содержащим вирусом, являющимся вириоидом, требующим для репликации наличия другого вируса (HBV - вируса семейства *НераDNAviridae*), Дельта-вирусом (HDV), близким по структуре к вирусам высших растений, нуждающимся для своей репликации и экспрессии на гепатоцитах в присутствии вируса гепатита В. Дельта-инфекция протекает по типу коинфекции или суперинфекции с ВГВ, характеризуется тяжелым течением и часто неблагоприятным исходом (нередко заканчивается развитием фульминантного гепатита, хронического гепатита и цирроза печени).

МКБ-10

- В 16.0 Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой
- В 16.1 Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы
- В 17.0 Острая дельта (супер)инфекция вирусоносителя гепатита В
- В 18.0 Хронический вирусный гепатит В с дельта-антигеном

Классификация вирусного гепатита дельта

Дельта – коинфекция – одновременное инфицирование вирусами гепатита Дельта и гепатита В.
Дельта – суперинфекция – инфицирование вирусом гепатита Дельта ребенка с хроническим гепатитом В или носителя HBsAg (латентная форма HBV – инфекции).
По характеру течения: острый гепатит D; хронический гепатит D.

Пример формулировки диагноза:

Острый гепатит В с дельта-агентом (Дельта-коинфекция) без печеночной комы (HBsAg +; antiHBcorIgG +, anti HBe +) + D (anti HDV+, antiHDVIgM(+), тяжелая форма.