

### 3.37. Острый вирусный гепатит С (HCV–инфекция)

Вирусный гепатит С (ВГС- HCV–инфекция) – острое или хроническое высокоактивное некро-воспалительное заболевание печени, вызываемое первично-гепатотропным РНК-содержащим HCV вирусом рода *Hepacivirus*, с естественными (сексуально-трансмиссивный – заболевание входит в группу ЗППП – заболевания передающиеся половым путем; вертикально-трансмиссивный – от матери к ребенку) и искусственными (гемоконтактный – при переливании компонентов крови, оперативные, внутривенные и другие инвазивные вмешательства) контактными механизмами заражения, характеризующееся полиморфизмом клинических форм – от бессимптомного носительства до фульминантных форм, хронического гепатита, цирроза печени и первичной гепатоцеллюлярной карциномы.

#### МКБ-10

B17.1 Острый вирусный гепатит С

#### Классификация острого вирусного гепатита С

Этиология	Клинический вариант	Течение	Тяжесть болезни	Активность воспалительного процесса (активность АЛТ выше нормы)	Осложнения	Исходы
Anti HCV IgM Anti HCV IgG	Желтушный  Безжелтушный	Острое (до 3 мес.)  Затяжное (более 3 мес.)  Хроническое (более 6 мес.)	Легкая  Среднетяжелая  Тяжелая  Фульминантная	Минимальная (в 1,5-2 раза) Низкая (в 2-5 раз) Умеренная (в 5-10 раз) Выраженная (более чем в 10 раз )	Печеночная кома	Выздоровление  Хронический гепатит  Цирроз печени  Первичная гепатоцеллюлярная карцинома

#### Пример формулировки диагноза:

Острый вирусный гепатит С (anti-HCV IgM положительный; РНК HCV положительный), вызванный вирусом генотипа 1a, легкой степени тяжести.