

3.38. ВИЧ-инфекция

ВИЧ-инфекция – медленная инфекция, вызываемая ретровирусами HIV-1 и HIV-2 семейства лентивирусов, поражающая клетки, имеющие CD4+ рецепторы – преимущественно иммунную систему (CD4+ Т-хелперы и др.), приводящая к вторичному иммунодефициту с развитием: вторичных инфекционных заболеваний (вплоть до стадии СПИДа); поражения ЦНС (мультифокальная энцефалопатия) и опухолей на поздних стадиях.

МКБ-10

B20. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней

Классификация ВИЧ-инфекции

I стадия – стадия инкубации

II стадия – стадия первичных проявлений

Варианты течения:

А бессимптомный период (стадия IА)

Б острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний (стадия IБ)

В острая инфекция с вторичными заболеваниями (стадия IВ)

III латентная стадия (субклиническая)

IV стадия вторичных заболеваний (клинических проявлений)

А – потеря веса менее 10%; грибковые, вирусные, бактериальные поражения кожи и слизистых; опоясывающий лишай; повторные фарингиты, синуситы.

Фазы течения:

Прогрессирование:

- при отсутствии антиретровирусной терапии
- на фоне антиретровирусной терапии

Ремиссия:

- спонтанная
- после ранее проводимой антиретровирусной терапии
- на фоне антиретровирусной терапии

Б – потеря веса более 10%; необъяснимая диарея или лихорадка более одного месяца; волосистая лейкоплакия; туберкулез легких; повторные или стойкие вирусные, бактериальные, грибковые, протозойные поражения внутренних органов; повторный или диссеминированный опоясывающий лишай; локализованная саркома Капоши.

Фазы течения:

Прогрессирование:

- при отсутствии антиретровирусной терапии
- на фоне антиретровирусной терапии

Ремиссия:

- спонтанная
- после ранее проводимой антиретровирусной терапии
- на фоне антиретровирусной терапии

В – кахексия; генерализованные бактериальные, вирусные, грибковые, протозойные и паразитарные заболевания; пневмоцистная пневмония; кандидоз пищевода, бронхов, легких; внелегочный туберкулез; атипичные микобактериозы; диссеминированная саркома Капоши; поражения центральной нервной системы различной этиологии.

Фазы течения:

Прогрессирование:

- при отсутствии антиретровирусной терапии
- на фоне антиретровирусной терапии

Ремиссия:

- спонтанная
- после ранее проводимой антиретровирусной терапии

- на фоне антиретровирусной терапии
V – Терминальная стадия.

Пример формулировки диагноза: Болезнь, вызванная ВИЧ, стадия, IVA, фаза ремиссии на фоне проводимой ВААРТ.