

Задача 3.39.1.

Игорь, 10 лет, семь дней назад вернулся из деревни, где проводил зимние каникулы, там ел салат из свежей капусты, хранившийся в подвале. Заболел остро: температура 38°C ремиттирующего характера в течение 6 дней, снижение аппетита, слабость, катаральные явления (ринит, боли в горле). С первого дня болезни сильные боли в правой подвздошной области и в области пупка, повторная рвота, стул до 6-8 раз в сутки кашицеобразный с примесью зелени и слизи.

Врач СМП обнаружил симптомы раздражения брюшины и госпитализировал ребенка в хирургическое отделение, где диагноз острого аппендицита был снят и мальчик был переведен в боксированное отделение с диагнозом: «Кишечная инфекция. ОРВИ». В последующие дни стул участился до 9-10 раз, разжиженного характера, со слизью и зеленью. Появилась легкая иктеричность склер, темная моча, увеличение печени и селезенки. Возникло подозрение на вирусный гепатит. Эпиданамнез: постоянно едят салаты из свежей моркови (из овощной ямы).

Клинический анализ крови: Hb 120 г/л, Эр – $3,8 \times 10^{12}$ /л, Le – $12,5 \times 10^9$ /л, п/я – 7%, с/я – 52%, л – 20%, э – 3%, м – 5%, СОЭ – 30 мм/час.

Общий анализ мочи, копрология – без патологических изменений.

Биохимический анализ крови: общий билирубин – 48 мкмоль/л, конъюгированный – 30 мкмоль/л, АЛТ – 62 Ед/л, АСТ – 58 Ед/л.

Маркеры вирусных гепатитов не обнаружены.

Из кала выделена Yersinia. Enterocolitica O3; РНГА Yersinia. Enterocolitica O3 титр 1/200; Ab Yersinia. Enterocolitica IgM positiv.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Иерсиниоз (Yersinia. Enterocolitica O3 из кала; РНГА Yersinia. Enterocolitica O3 титр 1/200; Ab Yersinia. Enterocolitica IgM+), гастроинтестинальная форма (энтероколит, терминальный илеит, гепатит), тяжелая форма.
2. ОКИ, вызванная Yersinia. Enterocolitica O3, гепатит.
3. ОКИ, вызванная Yersinia. Enterocolitica O3, энтероколит.