

Задача 3.40.1.

Девочка 8 лет, заболела остро с подъема температуры тела до 39,0°C. Отмечалась общая слабость, плохой аппетит, тошнота, боли в правой подвздошной области, мелкоточечная сыпь на теле – на гиперемизированном фоне. В клинике на 3-й день болезни состояние расценено как средней степени тяжести. При осмотре: определяется одутловатость и гиперемия лица и шеи. Язык обложен белым налетом, на участках очищения – малиновый. На коже – на всем теле обильные мелкоточечные и мелко-пятнистые, многие высыпания расположены вокруг крупных суставов, в области кистей рук и стоп. Со стороны легких и сердечно-сосудистой системы патологии не выявлено. Живот умеренно вздут, при пальпации определяется болезненность в правой подвздошной области. Печень пальпируется на 2,5-3,0 см ниже края реберной дуги, болезненная при пальпации. Селезенка не увеличена. Цвет мочи в течение 5 дней был насыщенным, цвет кала не менялся. Эпиданамнез: постоянно едят салаты из свежей моркови (из овощной ямы). *Клинический анализ крови:* Hb 120 г/л, Эр – $3,8 \times 10^{12}$ /л, Le – $19,5 \times 10^9$ /л, п/я – 7%, с/я – 52%, л – 20%, э – 3%, м – 5%, СОЭ – 30 мм/час.

Общий анализ мочи, копрология – без патологических изменений.

Биохимический анализ крови: общий билирубин – 68 мкмоль/л, конъюгированный – 30 мкмоль/л, АЛТ – 162 Ед/л, АСТ – 58 Ед/л.

Маркеры вирусных гепатитов не обнаружены.

Из кала выделена Yersinia. Enterocolitica O3; РНГА Yersinia. Enterocolitica O3 титр 1/200; Ab Yersinia. Enterocolitica IgM positive.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Псевдотуберкулез (*Yersinia Pseudotuberculosis*, I серотип из кала; РНГА *Yersinia. Pseudotuberculosis*, I серотип титр 1/200; Ab *Yersinia Pseudotuberculosis*, I серотип IgM+), гастроинтестинальная форма (энтероколит, терминальный илеит, гепатит), тяжелая форма.
2. Острая инфекционная эритема, вызванная *Yersinia Pseudotuberculosis*, I серотип.
3. Острая инфекционная эритема, гепатит, вызванные *Yersinia Pseudotuberculosis*, I серотип.