

3.41. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС - геморрагический нефрозононефрит *Nephrosonephritis haemorrhagica* - лат.) – острое инфекционное зоонозное заболевание вирусной природы, распространенное на определенной территории (природно-очаговая инфекция), вызываемое сферическими РНК-содержащими Hantaan-вирусами семейства буньявирусов (*Bunyaviridae*) - Хантаан и Пуумала, характеризующееся лихорадкой, острым началом, поражением сосудов, развитием геморрагического синдрома, нарушениями гемодинамики и тяжелым поражением почек с возможным появлением острой почечной недостаточности.

МКБ-10

A98.5. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

Классификация ГЛПС

Период заболевания	Клинический синдром	Формы болезни	Степень тяжести	Осложнения
Инкубационный	Геморрагический	Типичная	Легкая	Специфические: (ИТШ; ДВС-синдром; отек легких и головного мозга; кровоизлияния в гипофиз, миокард, надпочечники, головной мозг; геморрагический менингоэнцефалит; профузные кровотечения; инфекционный миокардит; острая сердечно-сосудистая недостаточность; парез кишечника; вирусная пневмония и др.) Неспецифические: <ul style="list-style-type: none">● пиелонефрит● восходящий пиелит● гнойный отит● абсцессы, флегмоны● пневмонии● паротит● сепсис и др.
Начальный (лихорадочный; 1 неделя).	Почечный (с развитием ОПН)	Атипичная: - стертая - субклиническая	Средне-тяжелая	
Период ухудшения (олигоанурический; с 3-8-го до 12-го дня)	Абдоминальный		Тяжелая	
Полиурический	Нейроэндокринный			
Реконвалесценции	Менингоэнцефалитический			
	Гемодинамических расстройств			

Пример формулировки диагноза:

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, олигоурический период, тяжелая форма (РНИФ – 1:512). Осложнения: ИТШ 1 степени, острая почечная недостаточность.