

Задача 4.15.3.

Больная Р., 6 лет, поступает в стационар планово повторно с жалобами на субфебрилитет, боли в области коленных, голеностопных, лучезапястных и тазобедренных суставов, нарушение движений в тазобедренных суставах, утреннюю скованность суставов. Ребенок болен с 2 лет, когда после перенесенной ОРВИ отмечалось повторное повышение температуры, боли, припухлость и нарушение движений в коленных, голеностопных и лучезапястных суставах. Суставной синдром сохранялся в течение 6 месяцев и сопровождался увеличением СОЭ, гиперлейкоцитозом, умеренной анемией. В дальнейшем отмечалось вовлечение в процесс и других суставов. При осмотре в стационаре состояние девочки тяжелое. Пользуется костылями в связи с поражением тазобедренных суставов. Отмечается увеличение подмышечных (2x2 см) и кубитальных (1,5x1,5 см) лимфоузлов. Отмечается повышение местной температуры, увеличение в объеме и значительное ограничение движений в коленных, голеностопных и лучезапястных суставах, атрофия прилегающих мышц. Со стороны легких и сердца патологии не выявлено. Живот мягкий, безболезненный, печень +5 см, селезенка +1 см. Отправления не нарушены.

В анализе крови анемия легкой степени с ретикулоцитозом, лейкоцитоз 15 Гига/л, нейтрофилез с левым сдвигом, СОЭ 40мм/ч. *В биохимическом анализе крови* диспротеинемия с резким повышением гамма-глобулинов (30%), СРБ++, ревматоидный фактор отрицательный, LE клетки не найдены. *В анализах мочи* умеренная протеинурия, микрогематурия, гипостенурия, умеренное снижение СКФ в пробе Реберга, гипостенурия в пробе Зимницкого. *Рентгенограмма тазобедренных суставов* - распространенный остеопороз, деструкция хряща, сужение суставной щели, подвывих головки бедра справа. *УЗИ органов брюшной полости и почек* – без особенностей. Глазные среды прозрачны. ЭКГ – норма.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Ювенильный ревматоидный артрит, серонегативный, активность 3 ст, Rg 3 ст, ФН 2 ст.
2. ЮРА, полиартрит, без поражения глаз, серонегативный вариант, активность 3 степени, Rg 3.
3. Ювенильный ревматоидный артрит, суставно-висцеральная форма (полиартрит, лимфоаденопатия, нефрит, анемия), без поражения глаз, активность III, прогрессирующее течение, серонегативный, рентгенологическая стадия III, функциональная недостаточность IIБ.