

Задача 4.2.2.

Мальчик А., 9 месяцев, отстает в физическом развитии, мать отмечает усиление одышки и цианоза при физическом или эмоциональном напряжении. Ребенок от первой беременности, протекавшей с ОРЗ на 5-й неделе, токсокозом в первом триместре, фетоплацентарной недостаточностью, первых родов на 40-й неделе. Родился с дефицитом массы, с 2,5 месяцев переведен на искусственное вскармливание (вялое сосание, отказ от груди), плохо прибывает в массу, сидит с 8 месяцев, не встает, не ползает. Бронхитами и пневмониями не болел, с рождения у ребенка выслушивается грубый систолический шум, наблюдается кардиологом.

При осмотре: кожные покровы с цианотичным оттенком, периферический голубоватый цианоз, имеются проявления синдрома хронической гипоксии (мальчик пониженного питания, усилен венозный рисунок на грудной клетке, симптом «барабанных палочек» и «часовых стекол»). В покое умеренно выражены одышка и тахикардия. Тоны сердца удовлетворительной громкости, вдоль левого края грудины выслушивается систолический шум жесткого тембра, II тон ослаблен во втором межреберье слева. В легких пуэрильное дыхание, хрипов нет. Живот мягкий, печень +2 см, селезенка не пальпируется. Отеков, пастозности нет.

При обследовании в стационаре выявлены полицитемия, снижение парциального давления кислорода при исследовании газов крови, признаки перегрузки правых отделов сердца по ЭКГ, повышенная прозрачность легочных полей и изменение конфигурации сердца на рентгенограмме (сердце в виде сапожка, с подчеркнутой талией); высокий ДМЖП, гипоплазия ствола легочной артерии и стеноз легочной артерии, транспозиция аорты вправо и гипертрофия правого желудочка по данным Эхо-КГ.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Тетрада Фалло, НК ПА.
2. ВПС – тетрада Фалло, фаза относительной компенсации, НК ПА.
3. ВПС – тетрада Фалло.