

Задача 5.1.1.

Девочка И, 5 дней жизни. Родилась от молодых, здоровых родителей. Ребенок от 1-й беременности, 1-х родов в срок 40 недель. Во время беременности – патологии не было. Роды путем экстренной операции кесарева сечения. Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Масса при рождении 4200г, длина 56 см.

Ребенок с рождения беспокоен. Щадит шею. При осмотре: + с-м «короткой шеи», большое количество кожных складок в обл. шеи, + с-м «кукольной головки». Спонтанная двигательная активность снижена. Голова наклонена к левому плечу, лицом повернута вправо. В руках – выраженная мышечная гипотония, в ногах – гипертонус мышц-сгибателей. Рефлексы орального автоматизма +++, рефлексы с рук – резко снижены, быстро истощаются, с ног – торпидны. Перекрест ног в средней трети голеней. Отклонений по внутренним органам – нет.

На спондилограмме: ступенчатая деформация позвонков С4-С6. Выраженный отек мягких тканей перивертебрального пространства.

По данным нейросонографии – церебральная ишемия I степени.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Перинатальное поражение ЦНС гипоксически-ишемического генеза, средней степени тяжести, церебральная ишемия II степени, синдром угнетения. Родовая травма шейного отдела позвоночника и спинного мозга.
2. Родовая травма шейного отдела позвоночника и спинного мозга, синдром двигательных нарушений, парез Дюшена-Эрба.
3. Перинатальное поражение нервной системы травматического генеза, травма ШОП и спинного мозга (дислокация С4-С6), средней степени тяжести, синдром двигательных нарушений.