

### Задача 5.1.3.

Ребенок М. родился от 8-ой нежелательной беременности, 2-х своевременных родов. Матери 38 лет, страдает алкоголизмом 7 лет. Во время беременности женщина на учете в женской консультации не состояла, не обследовалась и не лечилась, злоупотребляла спиртным. Роды домашние. Ребенок оценен по шкале Петруса на 37 недель. Масса при рождении 1700г, длина 45см. Состояние с рождения – средней степени тяжести. Очень возбудим. Плач громкий, раздражительный. Сон поверхностный. Часто вздрагивает. Мышечный тонус диффузно повышен в верхних и нижних конечностях. Сухожильные рефлексы оживлены. Выраженный тремор кистей рук, стоп, подбородка. Провоцируются клonusы конечностей. Непостоянный горизонтальный нистагм. Менингеальные симптомы-отрицательные. Б.р. на уровне костей черепа, не пульсирует. Швы черепа сомкнуты. Множество стигм дизэмбриогенеза -

Данные дополнительных методов исследования:

*ОАК*: без патологии.

*Нейросонография*: органического поражения головного мозга не выявлено, церебральная ишемия I степени.

*б/х анализ крови* – глюкоза 2,5 ммоль/л, кальций ионизированный – 1,1 ммоль/л, лактат – 2,4 ммоль/л, С-реактивный белок – отр.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Перинатальное поражение нервной системы смешанного (ишемического, токсического, инфекционного) генеза, средней степени тяжести, церебральная ишемия I степени, гипертензивный синдром.
2. Перинатальное поражение нервной системы смешанного (ишемического, токсического, дизметаболического) генеза, средней степени тяжести, церебральная ишемия I степени, судорожный синдром.
3. Перинатальное поражение нервной системы токсико-метаболического генеза (алкогольный синдром плода), тяжелое, синдром гипервозбудимости, судорожный синдром.