

### Задача 5.2.1.

При проведении патронажа в 14 дней участковый врач-педиатр обнаружил у доношенного ребёнка: бледность кожи с сероватым колоритом, акроцианоз, «мраморный рисунок» на туловище и конечностях, вялое сосание, снижение мышечного тонуса и рефлексов, выраженный метеоризм. Состояние ребёнка оценено как тяжелое, температура тела  $38^{\circ}\text{C}$ . При аускультации — сердечные тоны глухие, тахикардия до 180 в минуту. В легких - жесткое дыхание, хрипов нет, ЧД=55 в мин. При пальпации живота — увеличение печени до +3,5см, селезенка + 0,5 см ниже края реберной дуги. Пупочная ранка и околопупочный валик гиперемированы, обильное гнойное отделяемое, пальпируется толстая пупочная вена. Диурез снижен. Моча светлая. Стула не было сутки.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Ранний внебольничный пупочный сепсис новорождённого неуточненной этиологии, септицемия.
2. Поздний пупочный сепсис новорождённого неуточненной этиологии, септикопиемия острая дыхательная недостаточность, недостаточность кровообращения.
3. Поздний внебольничный пупочный сепсис новорождённого неуточненной этиологии, септицемия.