

Задача 5.3.1.

Ребенок родился от четвертой беременности (в анамнезе у матери два медицинских аборта, одни срочные роды, ребенок здоров). Настоящая беременность осложнилась токсикозом первой и второй половины, угрозой прерывания. Роды в 38 недель гестации. Масса при рождении 3400г., длина 51 см. Оценка по Апгар 4/6 баллов. Проводились реанимационные мероприятия. К концу 1-х суток появилось желтушное окрашивание кожи, склер, отмечалось увеличение билирубина крови до 230,5 мкмоль/л, преобладала непрямая фракция. Группа крови ребенка А(II), резус-положительная; у матери - О(I), резус-отрицательная. Гемограмма без особенностей. Печень +2 см., селезенка не увеличена. На 4-й день жизни билирубин достиг 342 мкмоль/л, весь непрямой. Печень + 3,5 см, пальпируется край селезенки. Появилась неврологическая симптоматика: вялость, адинамия, снижение рефлексов, периодически – горизонтальный нистагм.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. ГБН на фоне резус-конфликта, легкая степень тяжести, желтушная форма.
2. ГБН на фоне резус-конфликта, средней степени тяжести, желтушная форма.
3. ГБН на фоне резус-конфликта, желтушная форма, тяжелая, осложненная билирубиновой энцефалопатией.
4. ГБН на фоне резус-конфликта, желтушная форма, тяжелая, осложненная синдромом сгущения желчи.
5. ГБН на фоне резус-конфликта, желтушная форма, средней тяжести, осложненная билирубиновой энцефалопатией.