

Задача 5.3.2.

Ребенок от третьей беременности, третьих родов. Группа крови матери 0(I), резус-положительная, ребенка – A(II), резус-положительная. Беременность протекала с анемией. Роды в срок, продолжительность 36 часов, воды отошли за 2 часа до начала родовой деятельности. Ребенок родился в легкой асфиксии, масса 3000 г., длина 50 см. При первом осмотре было обращено внимание на большую родовую опухоль в области теменных костей, умеренную бледность кожных покровов. Билирубин пуповинной крови 87 мкмоль/л, гемоглобин 150 г/л. К концу 1-го дня появилась желтуха, получал фототерапию. На 4-й день жизни желтуха усилилась, отмечалось увеличение печени до 3 см, пальпировался край селезенки. Билирубин крови 270 мкмоль/л, весь непрямой.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. ГБН на фоне резус-конфликта, легкая степень тяжести, желтушная форма.
2. ГБН на фоне АВ0-конфликта, средней степени тяжести, анемическая форма, неосложненная.
3. ГБН на фоне АВ0-конфликта, отечно-желтушная форма, тяжелая, осложненная билирубиновой энцефалопатией.
4. ГБН на фоне АВ0-конфликта, желтушная форма, тяжелая, осложненная синдромом сгущения желчи.
5. ГБН на фоне АВ0-конфликта, желтушная форма, средней тяжести неосложненная.