

5.5. Геморрагическая болезнь плода и новорожденного

Геморрагическая болезнь (ГрБН) – приобретенное или врожденное заболевание неонатального периода, проявляющееся повышенной кровоточивостью вследствие недостаточности факторов свертывания, активность которых зависит от витамина К.

МКБ-10

P53 Геморрагическая болезнь плода и новорожденного

Классификация геморрагической болезни новорожденного

1. По времени возникновения клинических симптомов выделяют формы заболевания:

Ранняя форма ГрБН. Характерно появление кровоточивости в первые часы или сутки жизни в виде кровавой рвоты (гематемезис), легочного кровотечения, кровоизлияния в органы брюшной полости (надпочечники, печень, селезенку), мелены. Может начаться уже внутриутробно, в этом случае у ребенка обнаруживают внутричерепные кровоизлияния, кефалогематому, кожные геморрагии, кровотечения из пупка.

Классическая форма ГрБН проявляется кровоточивостью на 2-5 день жизни. Характерно появление мелены и гематемезис; возможны кожные геморрагии (экхимозы, петехии), кровотечения при отпадении остатка пуповины, носовые кровотечения, кефалогематомы. При тяжелой гипоксии и родовой травме высок риск внутричерепных кровоизлияний, кровоизлияний под апоневроз, внутренних гематом, легочных и других кровотечений.

Поздняя форма ГрБН развивается в возрасте 2-12 недель на фоне переносимых заболеваний; проявляется внутричерепными кровоизлияниями, кожными экхимозами, меленой, гематемезис, кровотечениями из мест инъекций.

2. По степени тяжести: легкая, средней тяжести и тяжелая.

Пример формулировки диагноза:

Геморрагическая болезнь новорожденного, классическая, среднетяжелая форма, мелена.