

6.10. Тубулоинтерстициальный нефрит

Тубулоинтерстициальный нефрит (ТИН) – это острое или хроническое абактериальное неспецифическое воспаление межпочечной ткани почек, сопровождающееся вовлечением в патологический процесс канальцев, кровеносных и лимфатических сосудов, почечной стромы.

МКБ–10

N10 Острый тубулоинтерстициальный нефрит. При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код B95 -97

N11 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит. При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код B95 -97

N11.8 Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты

N12 Тубулоинтерстициальный нефрит, неуточнённый как острый или хронический

N16.3 Тубулоинтерстициальное поражение почек при нарушениях обмена веществ

Классификация тубулоинтерстициального нефрита

(Н.А.Коровина, М.С.Игнатова и соавт., 1984)

Варианты:

1. Токсико-аллергический
2. Дизметаболический
3. Поствирусный
4. Лептоспирозный
5. На фоне почечного дизэмбриогенеза
6. Аутоиммунный

Стадия:

* активная (1 степень, 2 степень, 3 степень)

* неактивная (клинико –лабораторная ремиссия)

Течение:

1. Острое
2. Хроническое:
 - манифестное
 - латентное
 - волнообразное

Функция почек:

1. Сохранена
2. Снижение тубулярных функций
3. Парциальное снижение тубулярных и гломерулярных функций
4. ХПН
5. ОПН

Примеры формулировки диагноза:

Тубулоинтерстициальный нефрит, токсико-аллергический, активность 3 степени, обострение, ОПН.

Тубулоинтерстициальный нефрит, дизметаболический, активность 1 степени, волнообразное течение, парциальное снижение тубулярных функций.