

## 6.2. Гломерулонефрит

Гломерулонефрит – приобретенное полиэтиологическое заболевание почек, для которого характерно иммунологическое воспаление с преимущественным поражением клубочков и возможным вовлечением в патологический процесс любого компонента почечной ткани.

### МКБ–10

N00 Острый нефритический синдром. Включён острый гломерулонефрит

N01 Быстро прогрессирующий нефритический синдром. Включает быстро прогрессирующий гломерулонефрит

N03 Хронический нефритический синдром. Включён хронический гломерулонефрит

N04 Нефротический синдром

N05 Нефритический синдром неуточнённый (включён гломерулонефрит без дополнительных уточнений)

### Классификация первичного гломерулонефрита у детей

(Всесоюзный симпозиум, Винница, 1976)

Форма	Активность	Состояние функции почек
Острый гломерулонефрит с острым нефротическим синдромом: - с нефритическим синдромом - с изолированным мочевым синдромом - с нефротическим синдромом, гематурией и гипертонией	Периоды: 1. Начальных проявлений 2. Обратного развития симптомов 3. Переход в хронический гломерулонефрит	1. Без нарушения функции почек 2. С нарушением функции почек 3. ОПН (острая почечная недостаточность)
Хронический гломерулонефрит - нефротическая форма - смешанная форма - гематурическая форма	1. Обострения 2. Частичной ремиссии 3. Полной клинико – лабораторной ремиссии	1. Без нарушения функции почек 2. С нарушением функции почек 3. ХПН (хроническая почечная недостаточность)
Подострый (злокачественный) гломерулонефрит		

### Примеры формулировки диагноза:

Острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом, период обратного развития, без нарушения функции почек.

Хронический гломерулонефрит, смешанная форма, обострение, с нарушением функции почек.