

6.8. Пиелонефрит

Пиелонефрит – воспалительное заболевание почечной паренхимы и лоханки, возникшее вследствие бактериальной инфекции.

МКБ–10

N10 Острый тубулоинтерстициальный нефрит (острый пиелонефрит кодируется в этой рубрике). При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код B95-B97

N11 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (включён хронический пиелонефрит).

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код B95-B97

N11.0 Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом

N11.1 Хронический обструктивный пиелонефрит

Классификация пиелонефрита у детей.

(М.Я.Студеникин соавт, 1980, с дополнениями В.Г.Майданника и соавт, 2002)

Форма	Активность	Стадия	Функция почек
Острый	1. Активная стадия 2. Период обратного развития симптомов 3. Полная клинико-лабораторная ремиссия	Инфильтративная Склеротическая	1. Сохранённые функции почек 2. Нарушенные функции почек
Хронический - первичный необструктивный - вторичный обструктивный или дизметаболический а) латентный б) латентный	1. Активная стадия 2. Частичная клинико-лабораторная ремиссия 3. Полная клинико-лабораторная ремиссия.	Инфильтративная Склеротическая	1. Сохранённые функции почек 2. Нарушенные функции почек 3. ХПН

Примеры формулировки диагноза:

Вторичный хронический пиелонефрит, обменный (оксалурия), рецидивирующее течение, частичная клинико–лабораторная ремиссия, инфильтративная стадия, с сохранённой функцией почек.

Острый пиелонефрит, активный период, инфильтративная стадия, с сохранённой функцией почек.