

### Задача 7.6.3.

Ребенок 2 года 6 месяцев поступил в отделение с жалобами на повышение температуры тела до  $39,5^{\circ}$ , сухой редкий кашель, снижение аппетита, боли в животе. Из анамнеза известно, что болен 5-е сутки. Заболевание началось остро с повышения температуры тела до  $39^{\circ}\text{C}$ , отмечались боли в животе, снижение аппетита. В первый день болезни осмотрен педиатром, назначена симптоматическая терапия. В последующие дни сохранялась фебрильная температура тела, боли в животе, появился редкий сухой кашель. Осмотрен хирургом, исключена острая хирургическая патология органов брюшной полости.

При осмотре – общее состояние тяжелое. Тяжесть состояния обусловлена выраженностью симптомов инфекционного токсикоза и дыхательной недостаточности. Лихорадит до  $40^{\circ}\text{C}$ . Отмечается одышка смешанного характера с втяжением межреберных промежутков, ЧД до 60 в мин. Кашель редкий, непродуктивный. Кожа бледная с сероватым колоритом. Цианоз носогубного треугольника. Слизистые бледные, сухие. Грудная клетка обычной формы, равномерно участвует в акте дыхания. При перкуссии звук с коробочным оттенком, слева ниже угла лопатки значительное укорочение звука. При аускультации дыхание жесткое, слева в нижних отделах резко ослаблено, хрипов нет. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий. Печень не увеличена. Физиологические отправления не нарушены.

*В общем анализе крови* – лейкоцитоз до 23 Г/л, нейтрофильный сдвиг влево, ускорение СОЭ до 32 мм/час.

*В биохимическом анализе крови* – повышение уровня прокальцитонина и СРБ.

*На рентгенограмме органов грудной клетки* – обширная инфильтрация, занимающая нижнюю долю левого легкого, затемнение диафрагмального синуса слева.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Пневмония внебольничная нижнедолевая слева, тяжелая, осложненная синпневмоническим плевритом.
2. Пневмония внутрибольничная нижнедолевая слева, тяжелая, осложненная синпневмоническим плевритом.
3. Пневмония внебольничная нижнедолевая слева, средней тяжести, осложненная синпневмоническим плевритом.
4. Пневмония внебольничная нижнедолевая слева, средней тяжести, осложненная метапневмоническим плевритом.
5. Пневмония внебольничная нижнедолевая слева, тяжелая, осложненная метапневмоническим плевритом.