

### Задача 9.1.3.

Девочка 8 лет, 4 месяца. Ребенок от 2-й, нормально протекавшей беременности и нормальных родов. Росла и развивалась удовлетворительно. Перенесенные заболевания: ОРВИ 2 раза в год, ветряная оспа в 6 лет. Прививки сделаны по возрасту. Больна в течение 2х месяцев. После перенесенного ОРВИ девочка стала жаловаться на жажду, повышенный аппетит, похудание, учащенное мочеиспускание. За 5 дней до госпитализации состояние резко ухудшилось, появились боли в животе, рвота, сонливость, запах ацетона изо рта. Накануне госпитализации появилась одышка, многократная рвота с болями в животе, сопорозное состояние.

При поступлении состояние тяжелое: резкая слабость, спит, но при обращении отвечает на односложные вопросы и тут же засыпает. Кожные покровы сухие, тургор тканей снижен. Одышка. При аускультации жестковатое дыхание. Тахикардия, тоны сердца приглушены. АД 90/50 мм рт. ст. Живот при пальпации болезненный. Печень + 1.5 см из под реберной дуги. Мочеиспускание частое. Сахар крови 30 ммоль/л, сахар в моче 5%, ацетон +++++, рН крови - 7.1, ВЕ - (-20).

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Сахарный диабет 1 тип, диабетический кетоацидоз, тяжелый.
2. Сахарный диабет 1 тип, впервые выявленный, фаза декомпенсации, кетоза.
3. Сахарный диабет 2 тип, фаза декомпенсации.